



Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y efectivas

RECUERDE: La COVID-19 es muy grave y puede provocar complicaciones médicas graves y la muerte.



La vacuna lo protege.

Fortalece las defensas naturales de su sistema inmunitario contra el virus. Si se expone a la COVID-19 después de ser completamente vacunado, su sistema inmunitario sabe cómo combatirla.



La vacuna protege a los demás.

Mientras más personas se vacunen, el virus tiene menos oportunidades de propagarse. Eso significa que las tasas de infección disminuirán, ¡y la pandemia terminará! Al vacunarse, protege a su comunidad.



Todas las vacunas aprobadas en Estados Unidos son seguras y altamente efectivas para prevenir la COVID-19.

Si es una de las muy pocas personas que contraen COVID después de vacunarse, la probabilidad de que sufra una enfermedad grave o muera es prácticamente cero. Más de 100,000 personas fueron voluntarias para participar en los estudios que demostraron que las vacunas son seguras.



Lo que puede esperar:

- El día de la vacuna llenará un formulario del Departamento de Salud en línea, en el que declara que es elegible.
- No debe tomar medicamentos antes, aunque puede tomarlos después si siente dolor.
- Usará su cubrebocas mientras se vacuna.
- Le aplicarán la vacuna en el brazo. Usted puede decidir en cuál brazo.
- Después de vacunarse, lo observarán por lo menos durante 15 minutos para detectar efectos secundarios.
- Si se aplica la vacuna de Pfizer o Moderna, regresará en 3 o 4 semanas por una segunda dosis. Si se aplica la vacuna de Johnson and Johnson, recibirá sólo una inyección.
- Se considerará que está completamente vacunado dos semanas después de su última dosis.

Efectos secundarios

Los estudios no han encontrado efectos secundarios graves de la vacuna. Muchas personas no presentan efectos secundarios. Algunas pueden presentar reacciones leves, tales como:

- Dolor o hinchazón en el brazo
- Fiebre o escalofríos
- Cansancio
- Dolor de cabeza

Estas reacciones **NO** significan que esté enfermo de COVID-19. Son signos de que su sistema inmunitario está preparando a su organismo para combatir el coronavirus. Estos efectos secundarios usualmente desaparecen en un período de 24 a 72 horas.

¿Puedo vacunarme si...

Estoy tomando medicamentos, incluyendo medicamentos psicotrópicos y para consumo de sustancias?	✓ Sí
Tengo trastornos concurrentes o trastornos de alto riesgo?*	✓ Sí
Soy un adulto mayor?*	✓ Sí
Tengo alergias no relacionadas con vacunas (por ejemplo, a medicamentos orales o a factores ambientales)?	✓ Sí
Tuve COVID-19 previamente, contraí COVID-19 entre mis dos dosis, o tengo COVID-19 ahora mismo?	✓ Sí Sin embargo, si actualmente es positivo para COVID-19, espere hasta que termine su período de aislamiento antes de visitar una clínica.
Soy menor de edad?	La vacuna de Pfizer se ha aprobado para personas de 16 años de edad en adelante.
Anteriormente he tenido una reacción alérgica a una vacuna o un medicamento inyectable?	Hable con su médico antes de vacunarse.
Estoy embarazada* o amamantando?	Hable con su médico antes de vacunarse.
Consumo drogas (no recetadas)?	✓ Sí

¿Es elegible para recibir la vacuna?

Visite <https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/>

Si recibe servicios de la OASAS, la OMH o la OPWDD y necesita ayuda con el proceso, visite <https://redcap.link/olov-eligible>

O llame al: 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829)

*Está en mayor riesgo de sufrir complicaciones de la COVID-19, así que recibirá prioridad para aplicarse la vacuna.