

COVID-19疫苗 是安全有效的

请记住：COVID-19是一种高危病毒，可能引发严重的并发症并可能致死。




疫苗可以保护您。

它能增强您的免疫系统对病毒的自然抵抗力。如果您在完全接种疫苗后接触到COVID-19病毒，您的免疫系统就会知道如何对抗它。



疫苗可以保护他人。

接种疫苗的人越多，病毒传播的机会就越少。这意味着感染率下降，疫情即将结束！通过接种疫苗，您将能够保护身边的人。



美国批准的所有疫苗在预防COVID-19方面都是安全有效的。

即使您是接种疫苗后还会感染COVID-19的极少数人之一，您因该病毒患重病或死亡的几率几乎为零。超过100,000人自愿参加了证明疫苗安全性的研究。



做好相关准备：

- 在接种疫苗当天，您需要在网上填写一份DOH表格以证明您的接种资格。
- 请勿在接种疫苗前服用止痛药，但如果在接种疫苗后感到疼痛，您可以服用止痛药。
- 在接种疫苗时，请佩戴口罩。
- 注射位置为上臂。您可以选择在哪个手臂注射。
- 接种疫苗后，您需要留院观察至少15分钟，以防出现任何副作用。
- 如果您接种的是Pfizer或Moderna疫苗，您将在3-4周后接种第二剂疫苗。如果您接种的是Johnson and Johnson疫苗，您只需要接种一剂。
- 在接种最后一剂疫苗两周后，您就属于“完全接种”了。

副作用

研究并未表明此类疫苗有严重副作用。许多人并未出现任何副作用。一些人可能出现轻微反应，例如：

- 手臂酸痛或肿胀
- 发热或发冷
- 疲倦
- 头痛

这些反应并不意味着您患上了COVID-19。这是您的免疫系统正在为您的身体对抗冠状病毒做好准备的迹象。这些副作用通常会在24-72小时内消失。

如我属于以下情况，我能接种疫苗吗？

我正在服用药物，包括精神药物和物质使用药物	✓是
我患有共病或高风险疾病*	✓是
我年纪较大*	✓是
我有过非疫苗过敏史（例如口服药物或环境过敏）	✓是
我曾感染过COVID-19、在两剂疫苗接种期间感染过COVID-19，或当前感染了COVID-19	✓是 然而，如果您当前为COVID-19阳性，请在隔离结束后再到诊所就诊。
我是未成年人	Pfizer疫苗已获批用于16岁及以上的人群。
我有疫苗或注射药物的过敏史	在接种疫苗前咨询您的医生。
我正在孕期*或哺乳期	在接种疫苗前咨询您的医生。
我正在服用（非处方）药物	✓是

*您患COVID-19并发症的风险更高，因此您可优先接种疫苗。

您是否有资格接种疫苗？

请浏览<https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/>

如果您正在接受来自OASAS、OMH或OPWDD的服务，并需要在此过程中获得协助，请浏览<https://redcap.link/olov-eligible>

或致电：1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829)