



COVID-19疫苗 是安全有效的

請記住：COVID-19是一種高危病毒，可能引發嚴重的併發症並可能致死。

疫苗可以保護您。




它能增強您的免疫系統對病毒的自然抵抗力。如果您在完全接種疫苗後接觸到COVID-19病毒，您的免疫系統就會知道如何對抗它。

疫苗可以保護他人。



接種疫苗的人越多，病毒傳播的機會就越少。這意味著感染率下降，疫情即將結束！透過接種疫苗，您將能夠保護身邊的人。

美國核准的所有疫苗在預防COVID-19方面都是安全有效的。



即使您是接種疫苗後還會感染COVID-19的極少數人之一，您因該病毒患重病或死亡的幾率幾乎為零。超過100,000人自願參加了證明疫苗安全性的研究。

做好相關準備：



- 在接種疫苗當天，您需要在網上填寫一份DOH表格以證明您的接種資格。
- 請勿在接種疫苗前服用止痛藥，但如果在接種疫苗後感到疼痛，您可以服用止痛藥。
- 在接種疫苗時，請佩戴口罩。
- 注射位置為上臂。您可以選擇在哪只手臂注射。
- 接種疫苗後，您需要留院觀察至少15分鐘，以出現任何副作用。
- 如果您接種的是Pfizer或Moderna疫苗，您將在3-4週後接種第二劑疫苗。如果您接種的是Johnson and Johnson疫苗，您只需要接種一劑。
- 在接種最後一劑疫苗兩週後，您就屬於「完全接種」了。

副作用

研究並未表明此類疫苗有嚴重副作用。許多人並未出現任何副作用。一些人可能出現輕微反應，例如：

- 手臂酸痛或腫脹
- 發熱或發冷
- 疲倦
- 頭痛

這些反應並不意味著您患上了COVID-19。這是您的免疫系統正在為您的身體對抗冠狀病毒做好準備的跡象。這些副作用通常會在24-72小時內消失。

如我屬於以下情況，我能接種疫苗嗎？

我正在服用藥物，包括精神藥物和物質使用藥物	✓是
我患有共病或高風險疾病*	✓是
我年紀較大*	✓是
我有過非疫苗過敏史（例如口服藥物或環境過敏）	✓是
我曾感染過COVID-19、在兩劑疫苗接種期間感染過COVID-19，或目前感染了COVID-19	✓是 然而，如果您目前為COVID-19陽性，請在隔離結束後再到診所就診。
我是未成年人	Pfizer疫苗已獲核准用於16歲及以上的人群。
我有疫苗或注射藥物的過敏史	在接種疫苗前諮詢您的醫生。
我正在孕期*或哺乳期	在接種疫苗前諮詢您的醫生。
我正在服用（非處方）藥物	✓是

*您患COVID-19併發症的風險更高，因此您可優先接種疫苗。

您是否有資格接種疫苗？

請瀏覽<https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/>

如果您正在接受來自OASAS、OMH或OPWDD的服務，並需要在此過程中獲得協助，請瀏覽<https://redcap.link/olov-eligible>

或致電：1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829)